

Studie ukazuje, že injekce inzulínu více než dvojnásobné riziko úmrtí u diabetiků typu II

naturalnews.com/039664_insulin_diabetes_death_risk.html

(NaturalNews) Podle *World Diabetes Foundation* užívá téměř jedna třetina všech diabetiků typu II denně injekce inzulínu jako součást jejich předepsaného léčebného protokolu. Ale nová studie publikovaná v *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism* odhaluje, že tato typická možnost terapie diabetu může být zodpovědná za více než zdvojnásobení rizika úmrtí ze všech příčin u pacientů s diabetem typu II.

Nová studie, kterou sestavili vědci z Velké Británie, zahrnovala pečlivé zkoumání bezpečnosti injekcí inzulínu, aby bylo možné důkladněji porozumět mnoha možným vedlejším účinkům léčby. S využitím dat z britské databáze General Practice Research Database, která zahrnovala téměř 85 000 pacientů s diabetem typu II, výzkumníci porovnali vedlejší účinky samotných injekcí inzulínu se čtyřmi dalšími běžnými léčebnými protokoly pro toto onemocnění.

Při použití metforminu v monoterapii jako základního referenčního faktoru výzkumný tým zjistil, že riziko závažné srdeční příhody, rozvoje první rakoviny nebo úmrtí vzrostlo o více než 30 procent, když byl k léčbě diabetu typu II jednoduše přidán inzulín. Bylo zjištěno, že monoterapie sulfonylureou je spojena se zhruba o 44 procent zvýšeným rizikem těchto stejných stavů, zatímco monoterapie inzulínem samotná byla spojena s celkovým zvýšením rizika o 80 procent.

Ve srovnání s monoterapií metforminem, monoterapií sulfonylureou, kombinovanou terapií metforminem plus sulfonylureou a kombinovanou terapií inzulinem a metforminem bylo zjištěno, že monoterapie inzulínem zvyšuje riziko mozkové mrtvice i rakoviny o asi 43 procent a závažných nežádoucích srdečních příhod asi o 74

procent. A zatímco riziko infarktu myokardu se při monoterapii inzulinem téměř zdvojnásobí, riziko neuropatie se podle údajů více než zdvojnásobí.

Největší skok byl zjištěn u renálních komplikací; u nichž je však třiapůlkrát vyšší pravděpodobnost výskytu v důsledku monoterapie inzulinem. A riziko úmrtí ze všech příčin se v důsledku monoterapie inzulinem více než zdvojnásobuje, což ilustruje závažné rizikové faktory spojené s užíváním tohoto běžně předepisovaného léku na cukrovku

. „U lidí s T2DM (diabetes mellitus II. typu) byla exogenní inzulinová terapie spojena se zvýšeným rizikem komplikací souvisejících s diabetem, rakovinou a mortalitou ze všech příčin,“ napsali autoři ve svém závěru. "Existuje jasná potřeba přezkoumat způsob, jakým se exogenní inzulin používá u lidí s diabetem typu II

, a podrobně stanovit profil rizika a přínosu v různých fázích přirozené historie onemocnění a ve fenotypicky odlišných podskupinách." prohlédněte si abstrakt studie zde:

<http://jcem.endojournals.org/content/98/2/668>

Můžete se také dozvědět více o tom, jak léčit cukrovku přirozeně, bez léků, na:

https://www.naturalnews.com/030150_diabetes_Americans.html

Zdroje pro tento článek zahrnují:

<http://jcem.endojournals.org/content/98/2/668>

<http://www.healio.com>

<http://www.cpmedical.net>



[Hledejte na GoodGopher.com](http://www.GoodGopher.com)

[GoodGopher.com](https://www.GoodGopher.com) je nový vyhledávač pro hledače pravdy.

Sledujte aktuální zprávy o

[inzulínu](#) na [FETCH.news](https://www.FETCH.news)


[Svět nezávislých médií, vše na jednom místě.](#)


Získejte náš bezplatný e-mailový zpravodaj



Získejte nezávislá upozornění na novinky o přírodních léčích, laboratorních testech v potravinách, konopné medicíně, vědě, robotice, dronech, soukromí a dalších.

-
-
-
-
-
-
-
-
-





Další novinky o [inzulínu](#)

[Hořčík – kúra na hubnutí](#)

[Můžete zabránit a vyléčit těhotenskou cukrovku a snížit riziko autismu u vašeho dítěte](#)

[Užívání metforminu a inzulínu ve spojení zvyšuje riziko úmrtnosti pacientů s diabetem](#)

Hladovění a obezita

Nízký obsah vitamínu D spojený s inzulínovou rezistencí: Studie

Studie ukazují, že chlorella může zlepšit citlivost na inzulín u pacientů s diabetem 2

Studie ukazuje, že vitamín D v kombinaci s cvičením je zásadní pro zvrácení inzulínové rezistence u diabetiků 2. typu

GOT A NEWS TIP FOR NATURALNEWS?

Send us your news tip, and we'll investigate!

[Click here to submit a news tip to NaturalNews](#)

komentáře poháněné

Proveďte akci: Podpořte Natural News odkazem na tento článek z vašeho webu

Trvalý odkaz na tento článek:

Vložit odkaz na článek: (zkopírujte HTML kód níže):

Přetisk tohoto článku:

Nekomerční použití OK, citujte NaturalNews.com s kliknutím na odkaz.