

Výbušná studie: Vakcíny COVID způsobily více než 1000násobný nárůst krevních sraženin v mozku

 infokurýr.cz/n/2024/11/12/vybusna-studie-vakciny-covid-zpusobily-vice-nez-1000nasobny-narust-krevnich-srazenin-v-mozku

kurýr

12. listopadu 2024

Usvědčující nová recenzovaná studie potvrdila, že „vakcíny“ mRNA Covid způsobily ohromující 112 000% nárůst smrtelných krevních sraženin v mozku.

Tým předních amerických vědců zjistil, že injekce mRNA Covid přinesly 1 119,6krát vyšší riziko mozkových sraženin než očkování proti chřipce.

Na hlavní studii se podílel jeden z předních světových kardiologů Dr. Peter McCullough, zapojen.

Dr. McCullough bije na poplach kvůli výbušné studii, která zjistila děsivý nárůst mozkových trombů u lidí očkovaných Covidem.

McCullough a jeho tým odhalili alarmující údaje, které ukazují, že očkování Covid mRNA způsobilo ohromující 112 000% nárůst mozkových trombů.

Studie byla právě publikována v renomovaném International Journal of Innovative Research in Medical Science (IJIRMS) .

Studii provedli lékaři McCullough, Kirstin Cosgrove, James Thorp a Claire Rogers.

V rámci studie tým odborníků pod vedením Dr. Rogers všechny zprávy o mozkové tromboembolii za posledních 34 let.


Podle Johns Hopkins Medicine dochází k mozkové tromboembolii, když se v žilních dutinách mozku vytvoří krevní sraženina.

To zabraňuje odtoku krve z mozku.

Tento řetězec událostí je součástí mrtvice, která může poškodit mozek a centrální nervový systém a vést k náhlé smrti.

Je to známý vedlejší účinek očkování Covid mRNA.

Studie zkoumala údaje o hlášeních o mozkové tromboembolii po očkování proti Covidu, které byly předloženy americkému Centru pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a federálnímu systému hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS).



Překlad „X“ : „Studie Rogerse et al. s názvem „COVID-19 Vaccines: A Risk Factor for Cerebral Trombotic Syndromes“ byl po úspěšném přezkoumání právě publikován v *International Journal of Innovative Research in Medical Science*. „Metodika použitá pro tuto studii je následující: „Údaje byly shromážděny od 1. ledna 1990 do 31. prosince 2023 z databáze VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) (CDC) amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (VAERS) a americké Food Food a Drug Administration (FDA). Nežádoucí účinky CTE (cerebrální tromboembolismus) po očkování proti COVID-19 byly porovnány s účinky po očkování proti chřipce a všech ostatních očkováních pomocí analýzy poměrného hlášení (PRR) v čase. „Zjistili, že výskyt mozkové tromboembolie je o 112 000 % pravděpodobnější po očkování proti COVID-19 než po očkování proti chřipce. Pokud porovnáte vakcíny COVID-19 se všemi ostatními vakcínami dohromady, je pravděpodobnost o 20 700 % vyšší. Po očkování proti COVID-19 bylo během pouhých 3 let (36

měsíců) hlášeno 5 137 případů mozkové tromboembolie. Za posledních 34 let (408 měsíců) bylo hlášeno pouze 52 případů očkování proti chřipce.“ – Nicolas Hulscher, 6. listopadu 2024

Analyzovali všechny zprávy od ledna 1990 do prosince 2023.

Studie zjistila, že během tří let, kdy bylo k dispozici očkování mRNA Covid, bylo hlášeno 5 137 případů.

Za celých 34 let, pro které jsou k dispozici údaje, však bylo hlášeno pouze 52 cerebrálních tromboembolických onemocnění souvisejících s vakcínami proti chřipce.

Podle těchto údajů se počet mozkových tromboembolií zvýšil 1120krát s injekcemi Covid ve srovnání s očkováním proti chřipce za čas.

To odpovídá nárůstu o neuvěřitelných 111 795 %.

U všech vakcín kromě očkování proti chřipce bylo za posledních 34 let hlášeno 282 hlášení mozkové tromboembolie související s vakcínou.

To znamená, že riziko u nových vakcín je 207krát vyšší než u jiných vakcín, což představuje nárůst o 20 600 %.

Ve srovnání se všemi ostatními vakcínami dohromady způsobilo očkování proti Covidu 17 334% nárůst mozkové tromboembolie v průběhu času.

„Po vakcínách COVID-19 došlo k alarmujícímu překročení prahu bezpečnostního signálu ohledně nežádoucích reakcí mozkové trombózy ve srovnání s vakcínami proti chřipce a dokonce i ve srovnání se všemi ostatními vakcínami,“ uvedli autoři.

„Je nezbytné okamžité globální moratorium na používání vakcín COVID-19 s absolutní kontraindikací u žen v plodném věku.“

McCullough, široce publikovaný kardiolog, na svém osobním Substacku dodal , že zpráva „nezachytila rozsah trvalého neurologického poškození a invalidity, kterou tito pacienti utrpěli.

„Mohu vám říci, že sazby musí být velmi vysoké vzhledem k rozšířené povaze hlášených krevních sraženin,“ vysvětluje.

„Tato data a další jasně podporují odstranění všech vakcín a boosterů COVID-19 z trhu.

„Nikdo by neměl být vystaven riziku vážné mrtvice z vakcíny.“

Existuje dostatek důkazů, které spojují očkování Covid mRNA s několika smrtelnými nemocemi a náhlými úmrtími.

VAERS mimo jiné hlásí 37 647 úmrtí, 216 757 hospitalizací, 21 741 infarktů a 28 445 případů myokarditidy a perikarditidy (k 31. květnu) a dalších onemocnění.

Vědci CDC zjistili „vysokou míru ověření myokarditidy hlášení VAERS po očkování COVID-19 na bázi mRNA “ .

To vedlo k závěru, že „podhodnocené vykazování je pravděpodobnější“ než nadměrné vykazování.

Jak již dříve informoval Slay News , v únoru byla v renomovaném časopise *Vaccine* zveřejněna komplexní analýza 99 milionů lidí v osmi zemích .

Studie, dosud největší analýza, „pozorovala významně vyšší riziko myokarditidy po první, druhé a třetí dávce“ očkování proti Covidu na bázi mRNA.

Vědci také varovali před zvýšeným rizikem „perikarditidy, Guillain-Barrého syndromu a mozkové žilní trombózy“, stejně jako dalších „potenciálních bezpečnostních signálů, které vyžadují další zkoumání“ .

V dubnu soudní příkaz donutil CDC vydat 780 000 dosud nepublikovaných zpráv o závažných nežádoucích příhodách.

Mezitím studie elitních vědců v Japonsku zjistila „statisticky významný nárůst“ úmrtí na rakovinu po třetí dávce injekcí COVID-19 na bázi mRNA a nabídla několik teorií pro příčinnou souvislost.

Studie přichází uprostřed rostoucích obav z dlouhodobého dopadu celosvětové kampaně na očkování proti Covid mRNA.

Jak uvedl Slay News , světově uznávaný virolog, který sloužil jako hlavní poradce pro vakcíny Billa Gatese, varoval veřejnost, že „vlna“ „bezprecedentních úmrtí“ přichází k těm, kteří dostali injekce mRNA Covid.

Bývalý vědec nadace Bill & Melinda Gates a odborník na vakcíny Dr. Geert Vanden Bossche bil na poplach a varoval před blížící se „vlnou nemocnosti“ a „úmrtí“ mezi očkovánými proti Covidu.

Dr. Bossche varoval, že počty světové populace brzy zažijí „zcela bezprecedentní“ kolaps.

Bossche předpovídá, že „až 30–40 %“ obecné populace brzy zemře „v zemích s vysokou proočkováností“.

Špičkový vědec bil na poplach v rozhovoru s odborníkem na vakcíny a výzkumníkem Stevem Kirschem .

Bossche vysvětlil, že ve vyspělých, silně proočkovaných zemích se počet těžkých vln nemoci zvyšuje.

„V konečném důsledku by tento vývoj nevyhnutelně vedl ke vzniku vysoce virulentní varianty, která by vedla k vlnám hospitalizací a vážných onemocnění ve vysoce proočkovaných zemích – samozřejmě vždy ve stejných, pouze ve vysoce proočkovaných zemích,“ zdůraznil Bossche.

„Podle mého skromného názoru uvidíme něco zcela, zcela nepředvídaného, pokud jde o velikost vlny nemocnosti a bohužel i úmrtnosti,“ řekl.

Kirsch požádal Bossche o podrobnosti o tom, co by tento „zcela bezprecedentní“ budoucí fenomén obnášel.

Odpověděl předpovědí, že více než třetina všech lidí zemře v přímém důsledku zavedení očkování mRNA Covid.

„U některých silně proočkováných populací... by mě nepřekvapilo, kdybychom sledovali vážné zdecimování populace, možná **až 30 nebo 40 procent** v některých populacích,“ komentoval Bossche.

POHLED:

Mezitím vědci za další velkou studii dospěli k závěru, že očkování Covid mRNA způsobuje poškození mozku a spouští několik problémů s kognicemi.

Jak uvedl Slay News , tým špičkových výzkumníků v Jižní Koreji analyzoval elektronické zdravotní záznamy 4,3 milionů lidí v Soulu.

Výsledky studie byly zveřejněny v časopise MedRxiv Journal .

Výsledky studie byly alarmující.

Výzkumníci porovnávali výskyt různých nových onemocnění ve skupinách očkováných a neočkováných mRNA Covid během tříměsíčního období.

Studie zjistila, že ti, kteří dostali injekce mRNA, zažili:

- O 68 % více deprese
- O 44 % více úzkostí a souvisejících poruch
- O 93,4 % více poruch spánku
- o 138 % mírnější kognitivní porucha

- o 23 % více Alzheimerovy choroby

Od Franka Bergmana