

# Alarmující studie: Vakcína Pfizer zjištěna v játrech, slezině a vaječnicích

 necenzurovanapravda.cz/2024/08/alarmujici-studie-vakcina-pfizer-zjistena-v-jatrech-slezine-a-vajecnicich

23 srpna, 2024

Různé studie potvrzují, že genové injekce, zcela nesprávně prezentované jako vakcíny, měly mnoho různých nežádoucích účinků, přičemž mnohé se mohou projevit až po letech.

Hned zpočátku očkovací kampaně se ukázalo, že injekce neochrání před infekcí a ani před úmrtím „na covid,“ jak se tvrdilo. Naopak, každý další „posilovač“ znamená vyšší šanci na jakoukoli infekci, neboť imunita se postupně hroutí.

Stejně tak je prokázáno, že injekce nezůstává v místě vpichu, ale dostává se do celého těla, jak dokázala i studie.

Co je ovšem obzvlášť alarmující je fakt, že – jak zjistili na Novém Zélandu, ale také v odtajněných protokolech německé RKI – propagandisté, kteří injekce lidem vnucovali, o tomto problému velmi dobře věděli od prvního dne očkovací kampaně.

To jen potvrzuje, že ti, kteří celý covidový podvod v jednotlivých zemích řídili, si zcela jistě nenechali vpíchnout totéž, co – mnohdy pod výhružkami – vnucovali lidem.

Biodistribuce mRNA vakcíny Pfizer COVID-19 v lidském těle byla prokázána a tato informace byla regulačním orgánům Nového Zélandu známa již před schválením takzvané vakcíny.

Navzdory těmto poznatkům byla veřejnost nadále lživě informována, že produkt mRNA zůstane ve svalové tkáni paže.

Důležité body:

**Distribuce „vakcíny“ v těle:**

- Během 15 minut po injekci jsou lipidové nanočástice (LNP) nesoucí mRNA distribuovány do krevního řečiště.
- Koncentrace LNP v krvi po 8 hodinách klesá, zatímco v různých orgánech dále stoupá.
- Nejvyšší koncentrace LNP byly naměřeny v játrech, slezině a vaječnicích.
- Obzvláště znepokojivá je skutečnost, že studie byla zastavena po 48 hodinách, i když koncentrace nadále stoupaly v mnoha orgánech, zejména ve vaječnicích, kde se akumulace mezi 24 a 48 hodinami více než zdvojnásobila.

### **Konfliktní oficiální informace:**

- Ačkoli úřady byly informovány, že LNP byly distribuovány po celém těle, veřejnosti bylo řečeno, že produkt mRNA zůstane ve svalu horní části paže.
- Tyto nepravdivé informace byly použity ke zmírnění obav veřejnosti.

Produkt PFIZER COVID mRNA putuje do všech těchto tělesných systémů – a novozélandští regulátoři léčiv to věděli před schválením produktu...

Nová NZ OIA potvrzuje, že regulační orgány pro léčiva na Novém Zélandu obdržely tyto informace **PŘED schválením** injekce mRNA Covid společnosti Pfizer na Novém Zélandu.

### PFIZER COVID MRNA VACCINE BIO-DISTRIBUTION STUDY

Sample Total Lipid Concentration (µg lipid equiv/g (or mL))

	0.25h	1h	2h	4h	8h	24h	48h
<b>Injection site</b>	128.30	393.80	311.20	338.00	212.80	194.90	164.90
Adipose tissue	0.06	0.10	0.13	0.13	0.09	0.08	0.18
<b>Adrenal glands</b>	0.27	1.48	2.72	2.89	6.80	13.77	18.21
Bladder	0.04	0.13	0.15	0.17	0.15	0.25	0.37
Bone (femur)	0.09	0.20	0.27	0.28	0.34	0.34	0.69
<b>Bone marrow (femur)</b>	0.48	0.96	1.24	1.24	1.84	2.49	3.77
Brain	0.05	0.10	0.14	0.12	0.07	0.07	0.07
Eyes	0.01	0.04	0.05	0.07	0.06	0.09	0.11
<b>Heart</b>	0.28	1.03	1.40	0.99	0.79	0.45	0.55
<b>Kidneys</b>	0.39	1.16	2.05	0.92	0.59	0.43	0.42
Large intestine	0.01	0.05	0.09	0.29	0.65	1.10	1.34
<b>Liver</b>	0.74	4.62	10.97	16.55	26.54	19.24	24.29
<b>Lung</b>	0.49	1.21	1.83	1.50	1.15	1.04	1.09
Lymph node (mandibular)	0.06	0.19	0.29	0.41	0.53	0.55	0.73
<b>Lymph node (mesenteric)</b>	0.05	0.15	0.53	0.49	0.69	0.99	1.37
Muscle	0.02	0.06	0.08	0.10	0.10	0.10	0.19
<b>Ovaries (females)</b>	0.10	1.34	1.64	2.34	3.09	5.24	12.26
Pancreas	0.08	0.21	0.41	0.38	0.29	0.36	0.60
Pituitary gland	0.34	0.65	0.87	0.85	0.41	0.48	0.69
Prostate (males)	0.06	0.09	0.13	0.16	0.15	0.18	0.17
Salivary glands	0.08	0.19	0.26	0.22	0.14	0.17	0.26
Skin	0.01	0.21	0.16	0.15	0.12	0.16	0.25
<b>Small intestine</b>	0.03	0.22	0.48	0.88	1.28	1.30	1.47
Spinal cord	0.04	0.10	0.17	0.25	0.11	0.09	0.11
<b>Spleen</b>	0.33	2.47	7.73	10.30	22.09	20.08	23.35
Stomach	0.02	0.07	0.12	0.14	0.27	0.15	0.22
Testes (males)	0.03	0.04	0.08	0.13	0.15	0.30	0.32
Thymus	0.09	0.24	0.34	0.34	0.20	0.21	0.33
Thyroid	0.16	0.54	0.84	0.85	0.54	0.58	1.00
Uterus (females)	0.04	0.20	0.31	0.14	0.29	0.29	0.46
<b>Whole blood</b>	1.97	4.37	5.40	3.05	1.31	0.91	0.42
<b>Plasma</b>	3.96	8.13	8.90	6.50	2.36	1.78	0.81
Blood:plasma ratio	0.82	0.52	0.55	0.51	0.56	0.53	0.54

source: <https://www.tga.gov.au/sites/default/files/foi-2389-06.pdf>

Released March 2023 by the Australian health authorities in response to a freedom of information request.

## Kombinace s tabulkovou analýzou:

Analýza tabulky podrobně ukazuje, jak se koncentrace lipidů v různých orgánech a tkáních vyvíjejí v průběhu času po injekci. Nejvyšší akumulace byly pozorovány v játrech, slezině a vaječnících, což je zvláště znepokojivé, protože studie byla zastavena, když akumulace v mnoha orgánech stále narůstala.

Tyto informace, které měly úřady před schválením vakcíny, vyvolávají vážné otázky o bezpečnosti takzvané mRNA vakcíny a dlouhodobých účincích produkce spike proteinu v téměř všech orgánech těla.

Tato studie by měla být masivním varovným signálem o bezpečnosti „vakcíny,“ zejména proto, že dlouhodobé účinky produkce mRNA v různých orgánech jsou stále neznámé.

Ohodnoťte tento příspěvek!

■ [Celkem: 9 Průměrně: 4.2]