

# Studie: U pacienta se vyvinul akutní syndrom po „očkování“ proti Covidu

 [necenzurovanapravda.cz/2024/09/studie-u-pacienta-se-vyvinul-akutni-syndrom-po-ockovani-proti-covidu](https://necenzurovanapravda.cz/2024/09/studie-u-pacienta-se-vyvinul-akutni-syndrom-po-ockovani-proti-covidu)

16 září, 2024

Výčet problémů, které se objevují v souvislosti s aplikací takzvaných „Covid vakcín,“ se den za dnem rozšiřuje. Mnoho nemocných tak vůbec nemusí vědět, že jejich zdravotní problém souvisí právě s genovou injekcí.

Podle lékařské případové studie zveřejněné v srpnu byl jednomu muži po podání vakcíny proti Covidu od společnosti Pfizer (BNT162b2) diagnostikován nový syndrom, nyní nazvaný „akutní syndrom po očkování proti Covidu.“

„Pacientem je 47letý muž s 10letou anamnézou spondylartrózy spojené s HLA-B27 bez recidivy, u kterého se po první dávce vakcíny Pfizer BNT162b2 rozvinul akutní a postakutní syndrom COVID očkování (ACVS/PACVS),“ uvádí případová studie v sekci „Abstrakt.“

„PACVS se projevil jako onemocnění mozku, oční onemocnění a SFN (neuropatie).“

Nový syndrom může postihnout kohokoli v jakémkoli věku, kdo obdržel alespoň jednu dávku, objeví se v blíže nespecifikovanou dobu a potenciálně ho zabije.

„Nežádoucí účinky se mohou projevit jako akutní COVID vakcinační syndrom (ACVS) během několika hodin nebo několika dnů po očkování nebo jako postakutní COVID vakcinační syndrom (PACVS) několik dní či týdnů po očkování.

ACVS/PACVS může být mírný až smrtelný a může se objevit v jakémkoli věku,“ uvádí případová studie v části „Abstrakt.“

Bohužel, pro muže byla léčba většinou neúspěšná.

„Dva roky po nástupu nežádoucích účinků byly detekovány opakující se zvýšené protilátky proti Recoverinu.

Navzdory použití různých léčebných postupů většina symptomů přetrvávala déle než tři roky a pouze několik intervencí, jako jsou glukokortikoidy, hyperbarická oxygenoterapie, botulotoxin, inuspheresis a aferéza HELP (heparinem indukovaná mimotělní precipitace LDL) vykazovala přechodný příznivý účinek,“ uvádí případová studie v sekci „Abstrakt.“

Mezi vedlejší účinky nového syndromu patří malátnost, chronická únava, dysfunkce periferních nervů, dysestézie (nepříjemný abnormální pocit při dotyku), motorická slabost, bolest, vazomotorická dysfunkce, kardiovaskulární poruchy, kognitivní poruchy, bolesti hlavy a zrakové nebo akustické dysfunkce.

„Syndrom postakutní vakcinace COVID-19 (PACVS) je chronické onemocnění vyvolané očkováním proti SARS-CoV-2,“ uvádí studie v sekci „Abstrakt.“

„Postakutní vakcinační syndrom COVID-19 je odlišen od normálního postvakcinačního stavu pozměněnými protilátkami proti receptoru, zejména protilátkami proti angiotenzinu II typu 1 a alfa-2B adrenergním receptorům.

Je třeba poznamenat, že pacient v kazuistice má v anamnéze autoimunitní poruchy, nicméně nový syndrom není omezen pouze na pacienty s takovými onemocněními.

„Závěrem, tento případ nabízí příklad soubor příznaků po očkování proti SARS-CoV-2 (SC2V) u pacienta se specifickou autoimunitní poruchou a pozitivitou na antirecoverinové protilátky.

Tyto klinické projevy mohou být vyvolány přehnanou imunitní odpovědí známou jako multisystémový zánětlivý syndrom u dospělých na SC2V,“ uvádí případová studie v části „Abstrakt“.

**Covidové injekce jsou známé svým účinkem:**

- Způsobuje retardaci
- Obsahuje nanotechnologii, která se sama sestavuje
- Zaútočí v podstatě kdekoli v těle
- Zvýšení úmrtnosti po opakovaných dávkách
- Dvojnásobná úmrtnost pacientů s Covidem
- Očkované děti čelí o 4 423 procent vyšší úmrtnosti ze všech příčin
- 74 procent očkovaných, kteří zemřeli, bylo zabito injekcemi
- Úmrtnost je stále vyšší, než se uvádí
- Injekce zvyšuje míru nákazy Covidem
- Injekce zvyšuje úmrtnost ze všech příčin
- Injekce zvýšila počet mrtvých
- Injekce způsobuje spoustu bizarních a neobvyklých kožních poruch
- Masivní nárůst turbo rakoviny
- Rakovina tlustého střeva
- Reprodukční destrukce
- Potravy
- Oční paralýza
- Parkinsonova nemoc
- Tinnitus
- Hepatitida
- Krevní sraženiny v mozku
- Nezávažné poruchy
- Smrt v důsledku neurologických poruch
- Zvýšila nadměrnou úmrtnost
- Negativní změna imunitního systému
- Spuštěné autoimunitní poruchy štítné žlázy
- Smrtelné bolesti hlavy a záchvaty
- Záněť a nepravidelnosti srdce, včetně dětí
- Myokarditida/perikarditida
- Způsobuje, že kůže lidí „puká“
- Velké množství vážných onemocnění pozorovaných v masivních populačních studiích

- Obsahuje stonásobek přípustných úrovní kontaminace DNA vedoucí k mutagenním účinkům
- Kontaminovala krevní zásobení
- Trvale změnila DNA očkovaných a jejich potomků
- Některé šarže jsou horší než jiné a Moderna zabíjí o 30 procent více než Pfizer
- Injekce stále zabíjejí lidi a očekává se, že budou zabíjet lidi na velmi dlouhou dobu do budoucna

V USA CDC doporučuje, aby všichni Američané dostali desátou injekci proti Covidu a aby malé děti dostaly injekci navíc, zatímco Kanada doporučuje další injekci proti Covidu pro těhotné, domorodé a utlačované rasy „zasluhující si spravedlnost.“

K uvedenému jen připomínám, že během tohoto měsíce postupně probíhají kampaně na 10. dávku (8. posilovač) také v zemích EU, tedy již brzy zřejmě i u nás...

Ohodnoťte tento příspěvek!

■ [Celkem: 5 Průměrně: 5]